

**DMPB療法**

6週1コース

薬剤名	投与量	投与ルート	1コース目										
			1日目	4日目	8日目	11日目	15日目	22日目	25日目	29日目	32日目	36日目	37~42日目
ダラズマブ	1800mg/body	皮下注	○		○		○	○		○		○	休業
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注	○	○	○	○		○	○	○	○		
*メルファラン	9mg/m <sup>2</sup>	内服	○(d1~4)										
*ブレドニ	60mg/m <sup>2</sup>	内服	○(d2~4)										

薬剤名	投与量	投与ルート	2~9コース目										
			1日目	4日目	8日目	11日目	15日目	22日目	25日目	29日目	32日目	36日目	37~42日目
ダラズマブ	1800mg/body	皮下注	○					○					休業
ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注	○		○			○		○			
*メルファラン	9mg/m <sup>2</sup>	内服	○(d1~4)										
*ブレドニ	60mg/m <sup>2</sup>	内服	○(d2~4)										

4週1コース

薬剤名	投与量	投与ルート	10コース目以降	
			1日目	2~28日目
ダラズマブ	1800mg/body	皮下注	○	休業

支持療法	投与経路	用途
アセトアミフェン+H1ブロッカー+DEX+*ロイコトリエンブロッカー	内服	インフュージョンリアクション予防

\*メルファラン、ブレドニの投与量は患者の状態に応じて増減しています。

\*ロイコトリエンブロッカーは1コース目のd1のみ