

## VR-CAP療法

### 3週1コース

薬剤名	投与量	投与ルート	1コース				
			1日目	4日目	8日目	11日目	12～21日目
ドキルビシ	50m g/m <sup>2</sup>	点滴静注	○				休薬
シクロホスファミド	750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	○				
ホルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注	○	○	○	○	
リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		○			
プレドニゾロン	60～100m g/body	内服	○ (d1～5)				

支持療法	投与経路	用途
5-HT3製剤	点滴	制吐
ロキソプロフェン+H1ブロッカー	内服(d4)	インフュージョンリアクション予防

### 3週1コース

薬剤名	投与量	投与ルート	2コース目以降			
			1日目	4日目	8日目	11～21日目
ドキルビシ	50m g/m <sup>2</sup>	点滴静注	○			休薬
シクロホスファミド	750mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	○			
ホルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注	○	○	○	
リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		○		
プレドニゾロン	60～100m g/body	内服	○ (d1～5)			

支持療法	投与経路	用途
5-HT3製剤	点滴	制吐
ロキソプロフェン+H1ブロッカー	内服(d4)	インフュージョンリアクション予防